

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

使用上の注意改訂のお知らせ

2018年4月(No.2018-3)

経皮鎮痛消炎剤

ケトプロフェンテープ20mg「三和」 (旧販売名 タッチロンテープ20)

ケトプロフェンテープ40mg「三和」 (旧販売名 タッチロンテープ40)

KETOPROFEN

(ケトプロフェン含有プラスター剤)

※2017年12月、販売名変更

販売元
 **株式会社 三和化学研究所**
名古屋市中区東外堀町35番地 〒461-8631

製造販売元
救急薬品工業株式会社
富山県射水市戸破32-7 〒939-0351

この度、標記製品の「使用上の注意」を一部改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。つきましては改訂箇所を一覧に致しましたので、今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品のご使用にあたって副作用・感染症等をご経験の際には、弊社MRまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容(下線部: 自主改訂)

改訂後		改訂前	
4. 副作用 (2)その他の副作用		4. 副作用 (2)その他の副作用	
頻度 分類	頻度不明	頻度 分類	頻度不明
皮膚 ^{注)}	局所の発疹、発赤、腫脹、痒痒感、刺激感、水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱等	皮膚 ^{注)}	局所の発疹、発赤、腫脹、痒痒感、刺激感、水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱等
過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫	過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫
消化器	消化性潰瘍		
注)このような症状があらわれた場合は直ちに使用を中止すること。		注)このような症状があらわれた場合は直ちに使用を中止すること。	

2. 改訂理由

ケトプロフェン製剤の企業報告に基づき、[副作用]の[その他の副作用]の項に「消化器」を新設し、「消化性潰瘍」を追記しました。

医薬品添付文書改訂情報は医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp/>)並びに弊社ホームページ(<http://med.skk-net.com/>)に最新添付文書が掲載されます。あわせてご利用ください。

〔お問い合わせ先〕

株式会社三和化学研究所 コンタクトセンター

電話0120-19-8130

受付時間: 月～金曜日 9:00～17:00

(祝日及び弊社休業日を除く)

ホームページ <http://www.skk-net.com>