

# スイニー<sup>®</sup>錠 100mg

## を服用される患者様へ

スイニー錠は血糖値に応じてインスリン分泌を促すなどの作用により、血糖コントロールを改善するおクスリです。



1日に飲む回数は  
医師の指示通りに。  
毎日続けましょう。

### 飲み方について

- 1回1錠(または2錠)
- 1日2回(朝と夕)

服用のタイミングは、食事の前か後どちらでも構いません。  
腎臓にご病気のある方は1日1回の服用となる場合もあります。



### もし飲み忘れたら…

決して2回分を一度に飲まないでください。気づいた時に1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして次の時間に1回分飲んでください。



### 服用後のご注意

スイニー錠の服用をはじめると、「便秘」などの症状があらわれることがあります。

※ほかにも気になる症状がありましたら、かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。

◎このしおりの内容は、ご家族やまわりの方にもお知らせください。

# 低血糖について

血糖値の低くなりすぎた状態が「低血糖」です。低血糖は、進行すると意識を失うこともありますので、徴候が現れましたら早めに対策をとる必要があります。

## 低血糖は、なぜ起こる？

お薬の種類・  
量の間違い



食事の遅れ・  
量不足



長時間の運動



お酒の飲みすぎ



など

## このような症状にご注意

強い空腹感、脱力感、冷や汗、顔が青白い、手足のふるえ、動悸、気分が悪い など

頭痛、眠気、強い疲労感、めまい、言葉が出ない、動作がぎこちない、物が見えにくい など

意識を失う、けいれん、昏睡状態になる

低血糖の進行



## どのような対策が必要？

早めに気づいて対処することで、重い低血糖症状を避けることができます。まずは糖分(角砂糖、アメなど)を補給しましょう。それでも症状がおさまらない場合は、すぐに医療機関に連絡することが大切です。