

〈アーガメイト20%ゼリー-25g 患者指導箋〉

● 製品に封入されている患者指導箋を変更いたしました。(写真  部)

変更前

表面

裏面

アーガメイト[®]20%ゼリー-25gを服用される方へ



アーガメイト20%ゼリー-25gは、腎臓の病気によって過剰となったカリウムを体外に排泄して、血液中のカリウム値を改善するお薬です。

このお薬の開け方と服用のしかた

この薬は、必ず主治医または薬剤師の指示にしたがい、正しく服用してください。薬が2〜3個連なった形で処方されたときは、ミシン目を上下に2〜3度折り曲げてねじるように切り離してください。



① ふた(シール)に青色が印刷されているところが、あけ口です。



② あけ口の下のツメを押し下げて、シールとツメとの間にすきまをつくってください。



③ ツメを押し下げたまま、シールを引きはがしてください。



④ シールを完全にはがしてください。



⑤ カップ内のゼリー剤をスプーンですくって服用してください。

ざらざら感が気になる方へ

この薬を服用する時はひとくちずつスプーンにとり、服用してください。

ふたが開けにくい方へ

ふたの開け口部分の上にセロハンテープを貼って、テープごと上に引き上げるようにすると開けやすくなります。

※この薬には、環境保全への配慮から、スプーンは添付されていません。ご家庭のスプーンをお使いください。
※包材の材質はプラスチック製です。
[カップ: ポリアプロピレン]
[シール: ポリエチレン(アルミ箔入)]
捨てる時はお住まいの自治体の区分にしたがってください。(裏面もご覧ください)

このお薬を服用するときの注意

- 次のような場合には、早めに主治医または薬剤師に相談してください。
 - ・便秘、腹痛、おなかがふくれる、嘔吐などの消化器症状が強い時
 - ・その他、何か気づいた点やわからないことがあった時
- 医師の指示なしに、服用を中止しないでください。服用するのを忘れたときは、できるだけ早く1回分を服用してください。ただし次の服用時間が近いときは、1回分をとばして、次の服用時間に1回分を服用してください。絶対に1度に2回分を服用しないでください。
- 服用する時は、のどに詰まらせたり誤嚥(肺・気管に薬が入る)のおきないように、少量ずつスプーンにとり注意して服用してください。
- この薬の表面に凹凸があったり気泡が見えることもありますが、いずれも滅菌処理の過程で加熱した際に生じたものですから、品質に問題はなく、安全に服用できます。
- 開封後はすぐに服用し、残した場合は保管せず、廃棄してください。
- 本剤のカップ素材は、品質確保の為、通常より硬いプラスチックを使用しております。3連カップを切り離した後は、ミシン目で指など刺さないように、切り口にはご注意ください。

このお薬の保管のしかた

- 子どもが誤って口に入れたりしないよう、患者さん以外の手に届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け、室温で保管してください。冷蔵保存も可能です。ただし、冷凍保存は避けてください。
- 車の中など、高温下での保管はおやめください。



ND-9



表面

裏面

アーガメイト[®]20%ゼリー-25gを服用される方へ



アーガメイト20%ゼリー-25gは、腎臓の病気によって過剰となったカリウムを体外に排泄して、血液中のカリウム値を改善するお薬です。

このお薬の開け方と服用のしかた

この薬は、必ず主治医または薬剤師の指示にしたがい、正しく服用してください。薬が2〜3個連なった形で処方されたときは、ミシン目を上下に2〜3度折り曲げてねじるように切り離してください。



① ふた(シール)右下の△印が印刷されているところが、あけ口です。



② あけ口の下のツメを押し下げて、シールとツメとの間にすきまをつくってください。



③ ツメを押し下げたまま、シールを引きはがしてください。



④ シールを完全にはがしてください。



⑤ カップ内のゼリー剤をスプーンですくって服用してください。

ざらざら感が気になる方へ

この薬を服用する時はひとくちずつスプーンにとり、服用してください。

ふたが開けにくい方へ

ふたの開け口部分の上にセロハンテープを貼って、テープごと上に引き上げるようにすると開けやすくなります。

※この薬には、環境保全への配慮から、スプーンは添付されていません。ご家庭のスプーンをお使いください。
※包材の材質はプラスチック製です。
[カップ: ポリアプロピレン]
[シール: ポリエチレン(アルミ箔入)]
捨てる時はお住まいの自治体の区分にしたがってください。(裏面もご覧ください)

このお薬を服用するときの注意

- 次のような場合には、早めに主治医または薬剤師に相談してください。
 - ・便秘、腹痛、おなかがふくれる、嘔吐、下血などの消化器症状が強い時
 - ・その他、何か気づいた点やわからないことがあった時
- 医師の指示なしに、服用を中止しないでください。
- 服用するのを忘れたときは、できるだけ早く1回分を服用してください。ただし次の服用時間が近いときは、1回分をとばして、次の服用時間に1回分を服用してください。絶対に1度に2回分を服用しないでください。
- 服用する時は、のどに詰まらせたり誤嚥(肺・気管に薬が入る)のおきないように、少量ずつスプーンにとり注意して服用してください。
- この薬の表面に凹凸があったり気泡が見えることもありますが、いずれも滅菌処理の過程で加熱した際に生じたものですから、品質に問題はなく、安全に服用できます。
- 開封後はすぐに服用し、残した場合は保管せず、廃棄してください。
- 本剤のカップ素材は、品質確保の為、通常より硬いプラスチックを使用しております。3連カップを切り離した後は、ミシン目で指など刺さないように、切り口にはご注意ください。

このお薬の保管のしかた

- 子どもが誤って口に入れたりしないよう、患者さん以外の手に届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け、室温で保管してください。冷蔵保存も可能です。ただし、冷凍保存は避けてください。
- 車の中など、高温下での保管はおやめください。



W04A

アステラス製薬株式会社 株式会社 三和化学研究所

PE-10

変更後

〈アーガメイト89.29%顆粒5.6g 患者指導箋〉

- 製品に封入されている患者指導箋を変更いたしました。(写真  部)


変更前	変更後
<p>アーガメイト®89.29% 顆粒 5.6g を服用される方へ</p> <p>このお薬は血中のカリウム値を改善するお薬です。</p> <p>このお薬の服用のしかた</p> <p>このお薬は、顆粒を口に含んで、水を用いて飲みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1回分の量の薬を水30～50mL（コップのおよそ1/6～1/4杯）を用いて飲みます。 ● 1回分を1口で飲みきれないときは、何口かに分けて飲んでください。 <p>このお薬を服用するときの注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 次のような場合には、早めに主治医または薬剤師に相談してください。 <p>・便秘、腹痛、おなかがふくれる、嘔吐などの消化器症状が強い時 ・その他、何か気づいた点やわからないことがあった時</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 医師の指示なしに、服用を中止しないでください。 ● 服用するのを忘れたときは、できるだけ早く1回分を服用してください。ただし次の服用時間が近いときは、1回分をとばして、次の服用時間に1回分を服用してください。 ● 絶対に1度に2回分を服用しないでください。 ● 開封後はすぐに服用し、残した場合は保管せず、廃棄してください。 	<p>アーガメイト®89.29% 顆粒 5.6g を服用される方へ</p> <p>このお薬は血中のカリウム値を改善するお薬です。</p> <p>このお薬の服用のしかた</p> <p>このお薬は、顆粒を口に含んで、水を用いて飲みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1回分の量の薬を水30～50mL（コップのおよそ1/6～1/4杯）を用いて飲みます。 ● 1回分を1口で飲みきれないときは、何口かに分けて飲んでください。 <p>このお薬を服用するときの注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 次のような場合には、早めに主治医または薬剤師に相談してください。 <p>・便秘、腹痛、おなかがふくれる、嘔吐、下血などの消化器症状が強い時 ・その他、何か気づいた点やわからないことがあった時</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 医師の指示なしに、服用を中止しないでください。 ● 服用するのを忘れたときは、できるだけ早く1回分を服用してください。ただし次の服用時間が近いときは、1回分をとばして、次の服用時間に1回分を服用してください。 ● 絶対に1度に2回分を服用しないでください。 ● 開封後はすぐに服用し、残した場合は保管せず、廃棄してください。 <p style="text-align: right; font-size: small;">OF-2</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">アステラス製薬株式会社 株式会社 三和化学研究所</p>

〈個装ケース〉

- 販売包装単位コードを使用期限・製造番号を含むGS1合成シンボルとして一括表示表内にレーザーマーカで印字いたしました。(写真  部)

アーガメイト20%ゼリー25gは、個装ケースの開封口を天面に追加し、前面開封口の形状を変更し(写真  部)、用紙を変更いたしました。また、封緘テープの印刷色を白色から黒色に変更いたしました。天面、側面に5g/25gを追記いたしました。

アーガメイト20%ゼリー25g 60個ケース



※アーガメイト20%ゼリー25g 105個ケースも同様の変更です。

アーガメイト89.29%顆粒5.6g 84包ケースは、開封口の追加、変更はありません。

■ 変更品製造番号、出荷予定時期

品名	包装	統一商品コード	変更品製造番号	出荷予定時期
アーガメイト20%ゼリー25g	60個	233-10292-2	VT070F	2017年11月
	105個	233-10291-5	VT11AK	2017年12月
アーガメイト89.29%顆粒5.6g	84包	233-10297-7	*FL04401	2018年3月

● 統一商品コード・販売包装単位コード・調剤包装単位コード等、各種コードは変更ありません。

※ 流通在庫状況により出荷予定時期に若干の差異を生じることがございます。

■ 識別方法

アーガメイト20%ゼリー25g 60個、105個の個装ケースおよび段ボールケースに当分の間 **カップシール表示変更品** の表示をさせていただきます。

アーガメイト89.29%顆粒5.6g の個装ケースおよび段ボールケースに当分の間 **表示変更品** の表示をさせていただきます。

以上

● お知らせ **ア-ガメイト®20%ゼリ-25^g**

容器ラベルのデザインが変わりましたが、
お薬の内容は従来と変わりありません。



アステラス製薬株式会社 株式会社 三和化学研究所
PN438ARG (8)-1801

● お知らせ **ア-ガメイト®20%ゼリ-25^g**

容器ラベルのデザインが変わりましたが、
お薬の内容は従来と変わりありません。



アステラス製薬株式会社 株式会社 三和化学研究所
PN438ARG (8)-1801

● お知らせ **ア-ガメイト®20%ゼリ-25^g**

容器ラベルのデザインが変わりましたが、
お薬の内容は従来と変わりありません。



アステラス製薬株式会社 株式会社 三和化学研究所
PN438ARG (8)-1801

● お知らせ **ア-ガメイト®20%ゼリ-25^g**

容器ラベルのデザインが変わりましたが、
お薬の内容は従来と変わりありません。



アステラス製薬株式会社 株式会社 三和化学研究所
PN438ARG (8)-1801

● お知らせ **ア-ガメイト®20%ゼリ-25^g**

容器ラベルのデザインが変わりましたが、
お薬の内容は従来と変わりありません。



アステラス製薬株式会社 株式会社 三和化学研究所
PN438ARG (8)-1801

● お知らせ **ア-ガメイト®20%ゼリ-25^g**

容器ラベルのデザインが変わりましたが、
お薬の内容は従来と変わりありません。



アステラス製薬株式会社 株式会社 三和化学研究所
PN438ARG (8)-1801

● お知らせ **ア-ガメイト®20%ゼリ-25^g**

容器ラベルのデザインが変わりましたが、
お薬の内容は従来と変わりありません。



アステラス製薬株式会社 株式会社 三和化学研究所
PN438ARG (8)-1801

● お知らせ **ア-ガメイト®20%ゼリ-25^g**

容器ラベルのデザインが変わりましたが、
お薬の内容は従来と変わりありません。



アステラス製薬株式会社 株式会社 三和化学研究所
PN438ARG (8)-1801