

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

使用上の注意改訂のお知らせ

2020年1月 (No.2019-12)

高親和性AT₁レセプターブロッカー

●処方箋医薬品

オルメサルタン錠 5mg「三和」

オルメサルタン錠 10mg「三和」

オルメサルタン錠 20mg「三和」

オルメサルタン錠 40mg「三和」

OLMESARTAN

(日本薬局方 オルメサルタン メドキシミル錠)

販売元
株式会社 三和化学研究所
SKK 名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631

製造販売元
日本薬品工業株式会社
東京都千代田区岩本町2丁目2-3

高親和性AT₁レセプターブロッカー

●処方箋医薬品

オルメサルタンOD錠 10mg「アメル」

オルメサルタンOD錠 20mg「アメル」

OLMESARTAN

(オルメサルタン メドキシミル口腔内崩壊錠)

販売元
株式会社 三和化学研究所
SKK 名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631

製造販売元
共和 AMEL 共和薬品工業株式会社
大阪市北区中之島3-2-4

この度、標記製品の「使用上の注意」を一部改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。つきましては改訂箇所を一覧に致しましたので、今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品のご使用にあたって副作用・感染症等をご経験の際には、弊社MRまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容(下線部: 令和2年1月21日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知)

改訂後	改訂前
4. 副作用 (1)重大な副作用(頻度不明) 11) <u>間質性肺炎: 発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部 X 線異常等を伴う間質性肺炎があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。</u>	4. 副作用 (1)重大な副作用(頻度不明) 該当の記載なし

2. 改訂理由

令和2年1月21日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知に基づき、[副作用]の[重大な副作用]の項に「間質性肺炎」を追記しました。

医薬品添付文書改訂情報は医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)並びに弊社ホームページ(<https://med.skk-net.com/>)に最新添付文書が掲載されます。あわせてご利用ください。

〔お問い合わせ先〕

株式会社三和化学研究所 コンタクトセンター

電話0120-19-8130

受付時間: 月～金曜日 9:00～17:00

(祝日及び弊社休業日を除く)

ホームページ <https://www.skk-net.com>