

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2026年3月 (No.2025-9)

HMG-CoA還元酵素阻害剤

日本薬局方 ロスバスタチンカルシウム錠

処方箋医薬品

ロスバスタチン錠2.5mg/5mg「三和」

ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠

処方箋医薬品

ロスバスタチンOD錠2.5mg/5mg「三和」

製造販売元

 株式会社 三和化学研究所  
SKK 名古屋市中区東外堀町35番地 〒461-8631

この度、標記製品の「使用上の注意」を一部改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。つきましては改訂箇所を一覧に致しましたので、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

ご使用にあたって副作用・感染症等をご経験の際には、弊社MRまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容(下線部:自主改訂)

改 訂 後			改 訂 前		
10. 相互作用 10.2 併用注意(併用に注意すること)			10. 相互作用 10.2 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
チカグレロル [16.7.4参照]	略	略	チカグレロル	略	略
略	略	略	略	略	略
<u>ベルモスジル</u>	<u>本剤とベルモスジルを併用したとき、本剤のAUC<sub>0-last</sub>が4.62倍、C<sub>max</sub>が3.59倍上昇したとの報告がある。<sup>3)</sup></u>	<u>ベルモスジルのBCRP及びOATP1B1阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。</u>	該当の記載なし		
<u>モメロチニブ</u>	<u>本剤とモメロチニブを併用したとき、本剤のAUC<sub>inr</sub>が2.7倍、C<sub>max</sub>が3.2倍上昇したとの報告がある。<sup>4)</sup></u>	<u>モメロチニブのBCRP阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。</u>			
11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.7 過敏症状(0.1%未満) 血管性浮腫を含む過敏症状があらわれることがある。			11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.7 過敏症状(0.1%未満) 血管浮腫を含む過敏症状があらわれることがある。		

### 2. 改訂理由

Crestol錠/OD錠(成分名:ロスバスタチンカルシウム、代表会社:アストラゼネカ株式会社)の自主改訂に基づき、相互作用相手薬との記載の整合を図るため、[相互作用]の[併用注意]の項に薬剤名等を追記しました。

また、「血管浮腫」を関連学会のガイドライン等で使用されている「血管性浮腫」に記載整備しました。

医薬品電子添文改訂情報は医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)並びに弊社ホームページ(<https://med.skf-net.com/>)に最新の電子添文が掲載されます。あわせてご利用ください。

また、専用アプリ「添文ナビ」よりGS1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文や関連情報をご参照いただけます。

ロスバスタチン錠 2.5mg/5mg「三和」



ロスバスタチン OD 錠 2.5mg/5mg「三和」



〔お問い合わせ先〕

株式会社三和化学研究所 コンタクトセンター

電話0120-19-8130

受付時間：月～金曜日 9:00～17:00

(祝日及び弊社休業日を除く)

ホームページ <https://www.skf-net.com>