

「ラグノス®ゼリー分包16.05g」から 新しい製剤「ラグノス®NF経口ゼリー分包12g」へ 変更になりました。

高アンモニア血症による
症候に

変更前

ラグノス®ゼリー分包16.05g



変更後

ラグノス®NF経口ゼリー分包12g



※おくすりの有効成分であるラクツロースは、
どちらの製剤も1包に6.5g含まれています。
効果は変わりませんので、これまでと同じように
服用してください。

- 高アンモニア血症による症候の改善に、これまでと変わらず服用いただけます。
- 用法・用量はこれまでと変わりません。
1回1～2包を1日3回服用してください。

※おくすりの用法・用量については、医師や薬剤師の指示に従ってください。

<服用例>

朝



1～2包

昼



1～2包

夕



1～2包

● 新しい製剤の変更点は以下の通りです。

変更点その

1

1包あたりのゼリーの量は16.05gから12gになりました。

有効成分であるラクツロースの量は、1包あたりどちらも6.5gであり、効果は同じです。

変更点その

2

個包装の開封口が以下になりました。



- 切り口に開け方の手順を記載しています。
- 安全面に考慮し、角を丸くしています。
- 食品と間違えないよう、「くすり」と記載しています。

変更点その

3

ゼリーの色がうすくなりました。

ラグノス®ゼリー分包16.05g



淡褐色～褐色

ラグノス®NF経口ゼリー分包12g



無色～淡褐色

※添加物の変更により色と味が変わりましたが、効果は同じです。

その他、おくすりを飲むにあたって何か気になることがありましたら、医師、薬剤師にご相談ください。



株式会社 三和化学研究所

LAGNF-019 A00585