

ラグノス®NF経口ゼリー分包12gを 服用される方へ

高アンモニア血症による
症候に

ラグノス®NF経口ゼリーは高アンモニア血症による症候を改善するおくすりです。腸内でアンモニアを産生する菌の発育を抑制し、血液中のアンモニアの量を低下させ、症状を改善します。



ラグノス®NF経口ゼリーは 1日3回服用するおくすりです。

食事のタイミング(食前・食後)に関わらず服用いただけます。



<服用例>

朝



1~2包

昼



1~2包

夕



1~2包

※おくすりの用法・用量については、医師や薬剤師の指示に従ってください。

正しい開け方と飲み方

開け方

- スティックをタテに持ち、
- ① 切れ目の下を押さえます
 - ② 切れ目に沿って切り取ります



飲み方



切り口を口にくわえ、指でゆっくりとゼリーを押し出すよう袋をしぼり、お飲みください。無理に吸わないでください。

ラグノス®NF経口ゼリー分包12gを 服用される際に 気をつけていただきたいこと

●服用できない方

ガラクトース血症*の患者さん

該当する方は必ず医師や薬剤師に伝えてください

*ガラクトース血症：糖の一種であるガラクトースが、体内で代謝される際に必要な酵素の欠損(異常)により、ガラクトースが体内に蓄積してしまうことで特有の症状を発症する疾患です。

●副作用

おくすりの服用中に下痢をする、おなかが張るなどの

消化器症状が起こることがあります。

特に飲み始めの頃に多く見られます

すが、症状が気になる場合は医師

または薬剤師にご相談ください。



●飲み忘れ

服用し忘れた場合は、気がついた時点で1回分を服用してください。2回分を一度に服用してはいけません。

●開封後はすぐに服用してください。服用後にスティック内に残ったおくすりは、保存せずに廃棄してください。

●処方された患者さん以外の方は服用してはいけません。

その他、おくすりを飲むにあたって何か気になることがありましたら、医師、薬剤師にご相談ください。



株式会社 三和化学研究所

SSK

LAGNF-022 A00588