

## 効能・効果、用法・用量変更のお知らせ

スルホニルウレア系経口血糖降下剤

**グリメピリド錠 0.5mg「三和」**

**グリメピリド錠 1mg「三和」**

**グリメピリド錠 3mg「三和」**

(グリメピリド錠)

**GLIMEPIRIDE**

●劇薬、処方せん医薬品(注意-医師等の処方せんにより使用すること)

謹啓 平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたびご愛顧頂いておりますスルホニルウレア系経口血糖降下剤グリメピリド錠0.5mg「三和」、グリメピリド錠1mg「三和」、グリメピリド錠3mg「三和」につきまして小児適応が追加承認されましたので下記の通りご案内申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

### ■変更承認日

2011年2月17日

### ■効能・効果の新旧対比

変更前(取消線：削除箇所)	変更後(下線：変更箇所)
<p>■効能・効果■</p> <p>インスリン非依存型糖尿病 (ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。)</p> <p>■用法・用量■</p> <p>通常、<del>成人には</del>グリメピリドとして1mgより開始し、1日1~2回朝または朝夕、食前または食後に経口投与する。維持量は通常1日1~4mgで、必要に応じて適宜増減する。なお、1日最高投与量は6mgまでとする。</p>	<p>■効能・効果■</p> <p><u>2型糖尿病</u> (ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。)</p> <p>■用法・用量■</p> <p>通常、グリメピリドとして<u>1日0.5~1mg</u>より開始し、1日1~2回朝または朝夕、食前または食後に経口投与する。維持量は通常1日1~4mgで、必要に応じて適宜増減する。なお、1日最高投与量は6mgまでとする。</p>

※なお、組成、統一商品コードに変更はございません。