

効能・効果、用法・用量変更のお知らせ

A-IIアンタゴニスト

ロサルタンカリウム錠 25mg「DK」

ロサルタンカリウム錠 50mg「DK」

ロサルタンカリウム錠 100mg「DK」

(ロサルタンカリウム錠)

LOSARTAN POTASSIUM

●処方せん医薬品(注意—医師等の処方せんにより使用すること)

謹啓 平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたびご愛顧頂いておりますA-IIアンタゴニストロサルタンカリウム錠25mg「DK」、ロサルタンカリウム錠50mg「DK」、ロサルタンカリウム錠100mg「DK」につきまして効能・効果が追加承認されましたので下記の通りご案内申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■追加された効能

高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症

■変更承認日

2012年8月10日

■効能・効果、用法・用量の新旧対比

変更前
<p align="center">■効能・効果■</p> <p>高血圧症</p>
<p align="center">■用法・用量■</p> <p>通常、成人にはロサルタンカリウムとして25～50mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日100mgまで増量できる。</p>



変更後(下線：変更箇所)
<p align="center">■効能・効果■</p> <ol style="list-style-type: none"> 高血圧症 高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症
<p align="center">■用法・用量■</p> <ol style="list-style-type: none"> 高血圧症： 通常、成人にはロサルタンカリウムとして25～50mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日100mgまで増量できる。 高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症： 通常、成人にはロサルタンカリウムとして50mgを1日1回経口投与する。なお、<u>血圧値をみながら1日100mgまで増量できる。ただし、過度の血圧低下を起こすおそれのある患者等では25mgから投与を開始する。</u>

※なお、組成、統一商品コードに変更はございません。