

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2015年9月 (No.2015-6)

株式会社 三和化学研究所

広範囲経口抗菌製剤

●処方箋医薬品

**レボフロキサシン錠 250mg「杏林」**

**レボフロキサシン錠 500mg「杏林」**

**LEVOFLOXACIN**

(日本薬局方レボフロキサシン錠)

この度、標記製品の「使用上の注意」を一部改訂致しましたので、お知らせ申し上げます。つきましては改訂箇所を一覧に致しましたので、今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品のご使用にあたって副作用・感染症等をご経験の際には、弊社MRまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容(下線部: 自主改訂)

改 訂 後			改 訂 前		
3. 相互作用 併用注意 (併用に注意すること)			3. 相互作用 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
QT延長を起すことが知られている薬剤 デラマニド等	QT延長を起すおそれがある。	併用によりQT延長作用が相加的に増加するおそれがある。	該当の記載なし		

### 2. 改訂理由

[相互作用]の[併用注意]に「QT 延長を起すことが知られている薬剤(デラマニド等)」を追記しました。

医薬品添付文書改訂情報は医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp/>)並びに弊社ホームページ(<http://med.skk-net.com/>)に最新添付文書が掲載されます。あわせてご利用ください。