

## 用法・用量変更のお知らせ

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

**ピタバスタチンCa錠1mg「三和」**

**ピタバスタチンCa錠2mg「三和」**

(ピタバスタチンカルシウム錠)

**PITAVASTATIN**

●処方せん医薬品（注意－医師等の処方せんにより使用すること）

謹啓 平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたびご愛顧頂いておりますHMG-CoA還元酵素阻害剤ピタバスタチンCa錠1mg「三和」・ピタバスタチンCa錠2mg「三和」につきまして用法・用量から「夕食後」投与の制限が削除されましたので下記の通りご案内申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■「夕食後」投与制限の削除

■変更承認日

2014年3月10日

■用法・用量の新旧対比

変更前	変更後
<p>■用法・用量■</p> <p>通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回<u>夕食後</u>に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。</p>	<p>■用法・用量■</p> <p>通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。</p>

※なお、組成、統一商品コードに変更はございません。