

# リバスチグミンテープ「KMP」の使い方


このお薬は、皮膚から吸収された有効成分によって、  
もの忘れなどの認知症の症状進行を遅らせる働きがあります。

医師の指示に従って正しく使用してください。

1日1回、貼り替えるお薬です。

## テープを貼る場所

- 右の図で示した、背中、上腕、胸のいずれか1カ所に貼ります。  
(正常な皮膚で、清潔で乾燥した体毛が少ない場所、密着した衣服を  
着用してもこすれない場所を選んで貼ってください。)
- あらかじめ乾いたタオルなどで貼る場所を拭いて、水分や汗をよく  
取り除いてください。
- 傷や湿疹・皮膚炎などがある場所には貼らないでください。
- 貼る場所にクリーム、ローション、パウダーなどを塗らないでください。



## 貼るときの注意

- 貼る場所は毎回変え、同じ場所に続けて貼らないでください。
- 一度に2枚以上を貼らないように、まず前回貼ったテープをはがしてから、新しいテープを貼って  
ください。
- 1日1回、ほぼ同じ時間(約24時間毎)に新しいテープに貼り替えてください。
- このお薬は、切って使うことはできません。


## テープの貼り方

### 1 包装袋から取り出す




内部のテープを傷つけないように、  
手またはハサミで包装袋を切り、  
テープを取り出してください。

### 2 日付を記入する



テープ表面に、貼る日にちをペン・  
ボールペンなどで記入してください。  
(衣服への色移りにご注意ください。)


### 3 透明フィルムを半分はがす



テープには透明フィルムがついてい  
ます。粘着面に触れないように、透明  
フィルムの半分をはがしてください。


### 4 テープを貼る

粘着面を背中、上腕、胸の  
いずれかにあて、テープを  
貼ります。  
次に、残りの透明フィルム  
をはがしながら貼ってくだ  
さい。



### 5 テープを押さえる

テープがしっかりとくっつ  
くまで手のひらで押さえて  
ください。



(裏面もお読みください)

# リバスチグミンテープ「KMP」を使うときの注意

## 貼り忘れたとき、はがれたときの注意

- 貼り忘れに気付いたときは、そのときに貼ってください。次からはいつもと同じ時間に貼り替えてください。貼り替えていないことに気付いた場合でも、一度に2回分を貼らないでください。
- 4日間以上貼っていない場合は、医師にご相談ください。
- はがれたときは、新しいお薬に貼り替え、次からはいつもと同じ時間に貼り替えてください。

## 副作用に関する注意


- このお薬を開始したとき、または増量したときに、めまいや眠気がみられることがありますので、自動車の運転や危険な機械の操作はしないでください。
- 主な副作用として、お薬を貼った場所の皮膚症状(赤くなる、かゆみ、など)、嘔吐、悪心などが報告されています。気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。





## 保管上の注意

- 包装袋は貼る直前まで開けないでください。
- 子供やペットの届かないところに保管してください。
- 高温にならないところで保管してください。
- このお薬を家族や他の人にゆずってはいけません。

## テープを捨てるときの注意

- 皮膚を傷つけないよう、ゆっくりとやさしくはがしてください。
- はがしたテープは、まだお薬の成分が残っているので、接着面を内側にして半分に折りたたみ、子供やペットの届かないところに廃棄してください。
- テープをはがした手で目に触れないでください。
- テープをはがした後は、手を洗ってください。



テープイメージ (実物大)				
※数字は有効成分の含有量を示します				
包装袋の色	桃色	だいだい色	黄緑色	紫色

このお薬について分からないことがありましたら、担当の医師または薬剤師にご相談ください。