

アセトアミノフェン錠 200mg 「三和」  
生物学的同等性試験

(株) 三和化学研究所

2019.06 改訂

## 1. 方法

### (1) 試験方法

被験者 10 名を 5 名ずつの 2 群 (A、B) に分けた 2 剤×2 期のクロスオーバー法とし、休薬期間を 48 時間とした。

群	第 I 期	第 II 期
A	カロナール錠 200 2 錠	アセトアミノフェン錠 200mg 「三和」 2 錠
B	アセトアミノフェン錠 200mg 「三和」 2 錠	カロナール錠 200 2 錠

### (2) 試験薬剤

	試験製剤	標準製剤
	アセトアミノフェン錠 200mg 「三和」	カロナール錠 200
成分及び含量	1 錠中に「日局」アセトアミノフェン 200mg を含有する	
剤形	錠剤 (素錠)	錠剤 (素錠)
ロット No.	27BF1	2206L

### (3) 対象被験者

試験開始前に本試験の目的、内容及び予測される副作用等について説明文書に従って十分説明を受け、本人の自由意志による文書同意、署名を得た日本人健康成人男子 10 名とした。

### (4) 投与方法及び投与量

早朝空腹時にアセトアミノフェン錠 200mg 「三和」 2 錠、またはカロナール錠 2 錠を水 150mL と共に経口投与した。

## 2. 結果


### (1) 薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ		
	AUC <sub>0-12h</sub> ( $\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{mL}$ )	C <sub>max</sub> ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )	T <sub>max</sub> (h)	T <sub>1/2</sub> (h)	Ke1 (h <sup>-1</sup> )
アセトアミノフェン錠 200mg 「三和」 2錠	19.09 ±4.38	4.66 ±0.98	0.98 ±0.42	2.76 ±0.53	0.262 ±0.063
標準製剤 (錠剤、200mg)	18.65 ±4.36	4.69 ±1.46	0.95 ±0.59	2.77 ±0.29	0.254 ±0.044

(Mean±S. D., n=10)

### (2) 標準製剤と試験製剤の平均値の差 90%の信頼区間

パラメータ	対数変換値の差 90%の信頼区間
C <sub>max</sub>	log(0.84) ~ log(1.23)
AUC <sub>0-12h</sub>	log(0.95) ~ log(1.10)



## 3. 結論

生物学的同等性判定のパラメータである C<sub>max</sub> および AUC<sub>0-12h</sub> の対数変換値における非対称 90%信頼区間の結果が、評価基準 (log(0.8) ~ log(1.25)) を満たしていたことから、両剤は生物学的に同等であると判定された。