

アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」


を服用される患者様へ
(薬剤師から患者様への確認事項)

※これまで、服用されていた薬と服薬回数が異なる可能性がありますので、ご注意下さい。

●15mg錠を1日3回服用されていた場合

本剤は、徐放性の口腔内崩壊錠です。

1日1回、服用して下さい。唾液又は少量の水でも服用可能です。



●45mgカプセルを1日1回服用されていた場合

カプセル剤から、本剤に変わりますが、服薬回数は、1日1回のまま変わりません。



株式会社 三和化学研究所

名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631

●ホームページ<http://www.skk-net.com/>

2016年7月改訂

AMBO-04 85252 LMa 0716

アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 を服用される患者様へ

1. 飲み方について

**本剤は、1日1回服用する
徐放性の口腔内崩壊錠です。**

(服用の仕方) 口に含み舌で軽く潰して唾液で飲み込むか、少量の水で服用してください。

本剤は、くすりの味が苦手な方でも飲みやすいようにコーティングされています。

※舌で強く潰す、噛むなどコーティング層を剥がしてしまった場合には、くすりの苦味を少し感じる場合がありますので、ご注意ください。苦味が気になるようでしたら、服用後、少量の水をお飲みください。

2. 外観について

錠剤に黄色の粒が不均一に入っているように見えますが、おくすりの量は同じです。効き目に変わりはありません。

※黄色の粒はおくすりの有効成分を含んでいます。

おくすりを服用していて、何か変わったことがあった場合は、医師、薬剤師に相談してください。