


# アトルバスタチン錠「Me」を 服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



5mg (10錠シート)



10mg (10錠シート)

## このお薬を飲む時の注意点

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「おうもんきんゆうかいしよく横紋筋融解症」が起ることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

- ⚠ 筋肉が痛い
- ⚠ 手足に力が入らない
- ⚠ 尿の色が濃い(赤褐色になる)



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

裏面の注意事項も必ずお読みください。▶

株式会社 三和化学研究所

## その他の注意事項

- 指示された**食事療法**や**運動療法**を必ず守ってください。
- グレープフルーツジュース**によって、このお薬の作用が強くなることがありますので、**一緒に飲むことは避けてください。**
- 飲み忘れた場合は、気が付いたとき、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。**  
**絶対に2回分を一度に飲んではいけません。**
- 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。**
- 他のお薬(抗生剤など)を飲まれるときは、医師にご相談ください。また、体調に変化を感じたときは、必ず医師にご相談ください。**

おう もん きん ゆう かい しょう

### 横紋筋融解症とは

筋肉が傷害され、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色<sup>せきかつしよく</sup>の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気)になることもあります。

