



エスゾピクロン錠「KMP」を 服用される方へ

このお薬は、寝付きを良くし、眠りを持続させる働きがあります。

エスゾピクロン錠「KMP」



×

錠



×

錠



×

錠

を

就寝直前に服用してください。

(食事が遅くなった場合は、食後2時間以上たってから服用してください。)

※あなたの就寝・服薬時刻は()時が目安です。

※次回来院日は()週間後()月()日です。

次回来院時までに以下をご確認ください

- 寝付きは良くなりましたか？
- 夜中に起きてしまうことはありましたか？
- 朝はすっきり起きられましたか？



お薬の量や服用方法等については、必ず医師の指示に従ってください。

年齢、症状によって服用する「エスゾピクロン錠「KMP」」の量が異なる場合があります。気になる症状がある場合はご相談ください。

Memo



エスゾピクロン錠「KMP」の正しい飲み方

●必ず就寝直前に服用してください

トイレなどはすべて済ませ、薬を飲んだらすぐに布団に入りましょう。

●自己判断で、薬を中止にしたり、服用する量を変えないでください

自己判断で薬の服用を中止したり、量を増やしたりすると症状が悪化することがあります。

●食事と同時、または食後2時間は服用しないでください

薬の効果が弱くなったり、効き目が遅れたりすることがあります。



エスゾピクロン錠「KMP」の副作用について

主な副作用は「苦味」

エスゾピクロン錠「KMP」を服用中に、副作用として苦味があらわれることがあります。

苦味は翌朝に感じる人が多いです。



“苦味”への対処 ~ちょっとした工夫~

- 服用時は速やかに服用してください。口の中でなめたり、嚙んだりしないでください。
- 服用翌朝の苦味については、起床時の歯磨きや朝食をしっかりと摂ることで苦味が軽減されたとの報告があります。

(※苦味がつらいと感じたら医師・薬剤師に相談しましょう)



株式会社 三和化学研究所

2021年4月作成
ESZ-02 A01034 DK0421