

ニフェジピンCR錠「三和」を 服用される患者さんへお伝えください

医師又は薬剤師のみなさまへ

本剤は素錠に3層のフィルム（溶出制御層、主薬層、遮光層）をコーティングした徐放剤であり、外層の遮光層及び主薬層は服薬後数分で溶けてきますが、溶出制御層内の素錠部は数時間以上かかって主成分が溶出してきます。そのため、服薬患者さんの体調や体質により排便が数時間以内であれば、糞便中に錠剤の一部が排泄されることがありますので、予め患者さんへお伝えいただきますようお願い致します。



製造販売元
株式会社 三和化学研究所
SKK 名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631

2018年6月作成

NFCR-02 A00453 WK0618

ニフェジピンCR錠「三和」を 服用される患者さんへ

- (1) この錠剤は、グレープフルーツを食べたりグレープフルーツジュースを飲んだりすることで、作用が強くなることがあります。この錠剤の服用と同時に、グレープフルーツを食べたりグレープフルーツジュースを飲んだりしないでください。この錠剤は、水またはぬるま湯で服用してください。
- (2) この錠剤は、割ったり、かみくだいたりして服用すると、頭痛、顔面紅潮などが出やすくなる可能性があります。そのまま、かまずに服用してください。
- (3) この錠剤は1日1回～2回の服用で効果が発揮されるように設計された錠剤です。
服用すると錠剤の外側がすぐ溶けて効果を発揮したのち、内側がゆっくりと溶けだして効果を持続させます。
体調(下痢等)により服用後短時間で排便された場合、まれに錠剤の形のまま糞便中に排出されることがあります。
- (4) もし、服用期間中に体調の異変を感じられましたら主治医又は薬剤師にその旨をお伝えください。

病院・医院・薬局名