

ピタバスタチンCa錠「三和」 を服用される患者・保護者の皆様へ



株式会社 三和化学研究所

2019年12月改訂

PIT-04 85171 LMa1219

ピタバスタチンCa錠「三和」を服用される 患者・保護者の皆様へ

ピタバスタチンCa錠「三和」は、血液中のコレステロールを減らすおくすりです。

このおくすりは、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」*が起ることが知られています。次のような症状がみられましたら横紋筋融解症の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談下さい。服用量が増えた方は特にご注意下さい。

- 筋肉が痛い
- 手足の力が入らない
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)

副作用はどんなおくすりにもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば大事に至ることはほとんどありません。

また、ほかにもおくすりを服用して体調がおかしいと感じましたら主治医の先生または薬剤師の先生にご相談下さい。

(裏面につづく)

株式会社三和化学研究所

***横紋筋融解症とは:**

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

連絡先