

プレガバリンOD錠「KMP」を服用される患者様とそのご家族の方へ

- プレガバリンOD錠は神経の痛みに対するお薬です。
- 少しずつ用量を増やしていきます。
- 痛いときにだけ服用するのではなく、一定期間服用を続けることで効き目を発揮します。
- 痛みが軽減してきたらお薬をやめることも可能です。
- 治療には時間がかかることもありますので、身近な目標を立て、一歩ずつ治療に取り組みましょう。

お薬の量や服用方法等については、自分で判断せず、必ず医師の指示に従ってください。

プレガバリンOD錠「KMP」



プレガバリンOD錠
25mg[KMP]



プレガバリンOD錠
75mg[KMP]



プレガバリンOD錠
150mg[KMP]

OD錠は、唾液のみ(水なし)で口の中で溶かして服用できるお薬ですが、苦みを感じることもあるので、少量の水ですみやかに服用することをお勧めします。



株式会社 三和化学研究所

プレガバリンOD錠「KMP」服用にあたってご注意ください

- このお薬は、めまいや眠気、意識消失があらわれることがあります。
 - 特に高齢の方は、転倒の危険がありますので、十分に注意してください。
 - 服用中は事故の危険がありますので、自動車などの運転や危険を伴う機械の操作をしないでください。
- 人により体重が増えることがありますので、気になる徴候があらわれた場合には、ご相談ください。
- 腎臓が悪い方、透析を受けている方、心臓が悪い方、妊娠中または授乳中の方は、必ずご相談ください。
- ほかにお薬を服用している場合(薬局で買ったお薬も)、必ずお伝えください。
- アルコールはお薬の作用を強めることがありますので、注意してください。
- 誤って多く服用した場合はご相談ください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次に通常服用する時間が近い場合は飲まずに、次の服用時間から1回分を飲んでください。絶対に2回分を1度に飲まないようにしてください。
- ご自分の判断で服用を中止したり、服用量や服用回数を変更せず、必ず医師にご相談ください。
- 服用を急に中止すると、頭痛、下痢などがあらわれることがあります。

気になる症状がある場合、わからないことがある場合は、
医師または薬剤師にご相談ください。

●Memo



2020年9月作成

PRG-02 A00934 DK0920