

# タダラフィルOD錠ZA「トーフ」を服用される方へ

**この薬を安全に使用するため飲む前に必ずお読みください**

- この薬は、前立腺肥大症に伴う排尿障害の治療薬です。
- 狭心症などの心臓の疾患に使われるニトログリセリンなどの硝酸薬や肺高血圧症に使われるリオシグアトとこの薬は併用できません。重篤な副作用を起こすことがあります。
- 医師の指示通りに飲んでください。決して自分で飲む量を増やしてはいけません。必ず1日1回の服用としてください。
- この薬を飲んだ後、次のような症状があれば、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
  - 4時間以上勃起が続く
  - 目が見えにくい
  - 耳が聞こえにくい
- この薬は処方された患者さんのものです。決して他の人に譲り渡したりしないでください。
- その他、気になることや分からないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

- 舌の上で唾液を含ませ軽くつぶしてから、唾液と一緒に飲み込んでください。
- 水なしで飲むときは、寝たままでは飲まないでください。
- 普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。どちらの飲み方でも効き目は変わりません。

株式会社 三和化学研究所

2020年4月作成

TAD-02 A00856 WK0420