

# メトアナ®配合錠 ヨード造影剤使用時の注意点

**ヨード造影剤を投与する場合には  
メトアナ配合錠を一時的に中止してください。**

(緊急検査時を除く)

- ヨード造影剤投与後48時間はメトアナ配合錠の投与を再開しないでください。
- 投与再開時には患者の状態に注意してください。

メトホルミンによる重篤な副作用として乳酸アシドーシスがあります。ヨード造影剤の投与により一過性に腎機能が低下した場合、メトホルミンの排泄が減少し、乳酸の血中濃度が上昇することで乳酸アシドーシスを起こす危険性があります。

**メトアナ配合錠はメトホルミン塩酸塩(ビグアナイド薬)と  
アナグリブチン(DPP-4阻害薬)の配合剤です。**

## メトアナ配合錠LD

メトホルミン塩酸塩250mg / アナグリブチン100mg



## メトアナ配合錠HD

メトホルミン塩酸塩500mg / アナグリブチン100mg



詳細は添付文書をご覧ください。

「腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン2018」(日本腎臓病学会・日本医学放射線学会・日本循環器学会 共同編集、東京医学社)及び「メトホルミンの適正使用に関するRecommendation」(日本糖尿病学会・日本糖尿病協会)もご参照ください。



株式会社三和化学研究所