

ウリアデック[®]錠を服用される方へ



株式会社 三和化学研究所

2013年8月作成

UDC-015 85118 LMa0813

ウリアデック®錠を服用される方へ

ウリアデック®錠は、血液中の尿酸を下げるお薬です。血液中の尿酸が高くなる高尿酸血症や、痛風の患者様にお飲みいただくお薬です。

ウリアデック®錠のような血液中の尿酸を下げるお薬は、飲みはじめてから痛風発作が起きることがあります。

痛風発作が起きてもお薬を止めたりせず、そのまま飲み続けてください。

お薬を飲みはじめると、関節にたまっていた尿酸の結晶が溶け始めることで、痛風発作が起きることがあります。

痛風発作が起きている時にお薬を止めると、発作がひどくなる場合があります。ご自分の判断で止めたりせず、そのまま飲み続けてください。

痛風発作の治療には、医療機関にご相談いただくか、医療機関で処方された痛み止めを飲むなどしてください。

(裏面もお読みください)

このお薬の服用中に注意すること



次のような症状が急に出たら、医師や薬剤師にご相談ください。

食欲がなくなった、体がだるく感じるようになった、皮膚や白目が黄色くなった、吐き気、発疹、そのほか気になる症状がありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。



お薬を飲み忘れたときは…

飲み忘れに気がついたら、すぐに1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近いときは1回とばして、次の服用時間に1回分をお飲みください。決して2回分を一度に飲まないでください。



きちんと飲み続けることが大切です。

少ない量から飲みはじめ、その後徐々に飲む量を増やしていくお薬です。ご自分の判断で飲む量を変えたり、急にお薬を止めたりすると、痛風発作が悪化したり、再発したりするおそれがあります。

医師・薬剤師から指示された通り、毎日きちんと飲み続けてください。

医師の指示に従って、定期的に受診しましょう。