


パソレーターテープ27mgのご使用にあたって

パソレーターテープ27mgは、皮膚に貼ることで効果を示す心臓病の薬です。先生の指示に従って、正しく使用してください。

注意：この薬を貼る人はバイアグラ錠、レビトラ錠、シアリス錠等のED治療剤を服用しないでください。


貼る場所

白い布状のテープを胸、腰、上腕のいずれかに貼ってください




胸※

※AEDのときに、妨げにならないよう、イラスト指示の場所に貼ってください。



腰



上腕

使う時の注意

- ・この薬を貼る場所は事前にタオル等で水分や汗をよく拭き取ってから貼ってください。
- ・傷口、発赤、発疹、かぶれ等のある場所には貼らないでください。
- ・同じ場所に続けて貼ると、かぶれ等を生じることがありますので、場所を変えて貼ってください。また、**強いかぶれが生じた場合は先生にご相談ください。**

保管について

- ・開封後はただちにご使用ください。
- ・日のあたる場所や、高温（40℃以上）の場所には置かないでください。特に夏期の車内等では60℃を超えることがありますので、絶対に放置しないでください。
- ・小児の手の届かないところに保管してください。

パソレーターテープ27mgの使用法

注意：必ず白い布状テープを貼ってください。
透明フィルムは薬ではありません。

白い布状テープ




透明フィルム



薬の貼り方（下記の手順で皮膚にしっかりと貼ってください。）

- ① 2箇所の切り込みより開封し、テープを取り出してください。



- ② 透明フィルムを上にして2つに折り、透明フィルムの片側をはがします。



- ③ 白い布状テープをシワにならないように皮膚に貼ってください。



- ④ 残りの透明フィルムもはがし、白い布状テープ全体を貼ってください。

