

オロパジン点眼液 0.1%「三和」を使用される患者様へ



この点眼液は、アレルギー性結膜炎を治療するお薬です。

使用する際に注意すること

点眼前

手をきれいに洗ってください。



点眼時

1回1～2滴、1日4回（朝、昼、夕方及び就寝前）です。

決められた点眼回数をお守りください。

点眼のとき、容器の先が目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。

ソフトコンタクトレンズははずし、10分以上経ってから装着してください。

ハードコンタクトレンズの場合もはずして投与する方が安全です。



点眼後

点眼液が眼のまわりについたときはティッシュや清潔なタオルでふき取ってください。

他の目薬を使用するときは、5分以上の間隔を開けてください。



点眼以外の目的で使用しないでください。

オロパタジン点眼液 0.1%「三和」を使用される患者様へ

点眼液の保管・取扱いで注意すること

- 点眼袋は UV カット機能のある点眼袋です。使用後は点眼袋に入れて室温（1～30℃）で保管してください。
- 開封後は 4 週間以内に使用し、残液は使用しないでください。



その他、注意すること

- 医師に指示された用法・点眼方法を必ず守ってください。
- 点眼後、しみるなどの自覚症状が続く場合は、医師の診察を受けるようにしてください。
- その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。



株式会社 三和化学研究所

2021年9月作成

OLO-02 A01127 WK0921