

高カリウム血症改善剤
ポリスチレンスルホン酸Ca
経口ゼリー-20%分包25g「三和」
を服用される方へ



原寸大



この薬の名前と有効成分など

製品名	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
一般名 (有効成分)	「日局」ポリスチレンスルホン酸カルシウム
有効成分含量	1個(25g)中 5g
外観	淡黄白色～淡黄色のゼリー様

添加剤は、還元麦芽糖水アメ、クエン酸ナトリウム水和物、ゼラチン、カンテン、ペクチン、カラギーナンです。

この薬を服用する前に

次の人は、この薬を使用することはできません。

- 腸閉塞の人

次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- 便秘を起こしやすい人
- 腸管狭窄（腸が狭くなつて、食べたものが通りにくくなつた状態）の人
- 消化管潰瘍の人
- 副甲状腺機能亢進症の人
- 多発性骨髄腫の人
- 妊娠または妊娠している可能性のある人

この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

この薬のはたらき

ポリスチレンスルホン酸Ca 経口ゼリー 20%分包25g「三和」は、腎臓の病気によって過剰となったカリウムを体外に排泄して、血液中のカリウム値を改善するお薬です。

(この薬は、腎臓病の病気そのものを治すものではありません。)

腎臓のはたらきが高度に障害されると…




尿から排泄されるカリウムが少なくなります。



血液中のカリウム値が高くなると
くちびるや手足がしびれたり、
不整脈や心停止などが起こることがあります。

くちびるのしびれ



不整脈



心停止

この薬の開け方と服用のしかた

この薬は、必ず主治医または薬剤師の指示にしたがい、正しく服用してください。

薬が2～3個連なった形で処方されたときは、ミシン目を上下に2～3度折り曲げてねじるように切り離してください。



① ふた（シール）右下の△印が印刷されているところが、あけ口です。



② あけ口の下のツメを押し下げて、シールとツメとの間にすきまをつくってください。



③ ツメを押し下げたまま、シールを引きはがしてください。



④ シールを完全にはがしてください。



⑤ カップ内のゼリー剤をスプーンですくって一口ずつ服用してください。

※この薬には、環境保全への配慮から、スプーンは添付されていません。ご家庭のスプーンをお使いください。

※包材の材質はプラスチック製です。

カップ：ポリプロピレン
シール：ポリエチレン
(アルミ箔入)

捨てる時はお住まいの自治体の区分にしたがってください。

【ふたが開けにくい方へ】【ざらざら感が気になる方へ】【味が気になる方へ】

ふたの開け口部分の上にセロハンテープを貼って、テープごと上に引き上げるようにすると開けやすくなります。

冷蔵庫で冷やして噛み碎かず
に一口ずつ服用してください。
りんご味のフレーバーをご用意して
います。ご希望の場合
は、主治医または薬剤師の先生にご相談
ください。



この薬を服用するときの注意

- 次のような場合には、早めに主治医または薬剤師に相談してください。
 - ・便秘、腹痛、おなかがふくれる、嘔吐、下血などの消化器症状が強い時
 - ・その他、何か気づいた点やわからないことがあった時
- 本剤のカップ素材は、品質確保の為、通常より硬いプラスチックを使用しております。3連カップを切り離す際には、**ミシン目や切り離した角で指など刺さないように、切り口にはご注意ください。**
- 服用する時は、のどに詰まらせたり誤嚥（肺・気管に薬が入る）のおきないよう、**少量ずつスプーンにとり注意して服用してください。**
- 医師の指示なしに、服用を中止しないでください。
- 服用するのを忘れたときは、できるだけ早く1回分を服用してください。
ただし次の服用時間が近いときは、1回分をとばして、次の服用時間に1回分を服用してください。
絶対に1度に2回分を服用しないでください。
- この薬の表面に凹凸があったり気泡が見えることもあります
が、いずれも滅菌処理の過程で加熱した際に生じたもので
すから、品質に問題はなく、
安全に服用できます。
- 開封後はすぐに服用し、残し
た場合は保管せず、廃棄して
ください。



この薬の副作用

薬は人によって、目的の効果以外に望ましくない作用が出る場合もあります。

- 次のような症状に気づいたら、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

部位	自覚症状
口や喉	吐き気、嘔吐
全身	寒気、発熱、ふらつき
頭部	意識の低下
胸部	息切れ
腹部	激しい腹痛、お腹が張る、腹痛
便	便やおならが出にくい、下痢、便に血が混じる（暗赤色）



この薬の保管のしかた

- 小さなお子様が誤って服用しないよう、注意して保管してください。
- 直射日光を避け、室温で保管してください。冷蔵保存も可能です。ただし冷凍保存は避けてください。
- 車の中など、高温下での保管はおやめください。



使用期限の見かた



シールには使用期限が記載されています。
「2028.03」と書いてあれば
「2028年3月」まで服用できます。

医療機関名

発行：株式会社 **三和化学研究所**

2022年3月改訂
PSC-002A00964 MT1217