


セイブル錠・OD錠を服用される方へ


この薬は食後の血糖上昇を緩やかにして、食後の高血糖を改善するお薬です。服用される前に、以下の注意をよくお読みください。



セイブル錠25mg



セイブル錠50mg




セイブル錠75mg



セイブルOD錠25mg



セイブルOD錠50mg



セイブルOD錠75mg

飲み方と保管について

- ◆この薬は**必ず食事を始める時にお飲みください。**
- ◆もし、食事を始める時に飲み忘れ、食事中または食直後に気付いたときは、すぐにお飲みください。
- ◆主治医の指示を正しく守り、決して勝手に量や飲み方を変えないでください。
- ◆何か別の薬を飲む場合は、必ず医師や薬剤師にセイブル錠・OD錠を飲んでいることを話して指示に従ってください。
- ◆乳幼児、小児の手の届かないところで、光や湿気を避けて保管してください。

セイブルOD錠の場合

- ・セイブルOD錠は、舌の上でだ液を含ませ、舌で軽くつぶし、だ液のみで飲むことができます。普通の薬と同じように水で飲むこともできます。
- ・セイブルOD錠は、取り出してから長時間放置しないでください。

(※裏面も必ずお読みください。)

この注意は、必ず家族や周囲の方にも知らせておいてください

低血糖について

- ◆他の糖尿病の薬（血糖を下げる薬）と併用した場合、あるいは場合によっては、併用しなくても**低血糖**を起こすことがあります。
- ◆低血糖は、空腹の時、運動中や運動後、就寝前などに起こりやすく、主に次のような症状が現れます。



（その他の症状）呼吸がはよくなる、眠気、あくび、顔面蒼白、重篤な場合は、けいれん、意識を失う など

- ◆低血糖は危険な状態ですから、食事、運動、飲酒、薬の飲み方などについて医師の指示を守って、起こらないように注意し、もし起こったら軽いうちに治してしまわなければなりません。
- ◆軽い低血糖はブドウ糖をとると治ります。低血糖の症状が起こったら、その場ですぐに10gのブドウ糖をとってください。この薬は砂糖（ショ糖）などのブドウ糖以外の糖分の消化・吸収を遅らせますので、砂糖やあめ菓子など**ブドウ糖が含まれていないものでは効果が不十分です。**
- ◆低血糖を起こした場合は、必ず早めに主治医に知らせその指示に従ってください。
- ◆高所作業や自動車の運転等危険を伴う作業に従事しているときに低血糖を起こすと事故につながります。特に注意してください。

消化器症状について

- ◆この薬を飲むと、おなかが張る、おならの回数が増える、おなかが緩くなるなどの**消化器症状**が起こることがあります。特に飲み始めの頃に多くみられるのですが、症状が気になる場合は主治医や薬剤師にご相談ください。